


1. SEPTIC INFECTIVE AGENTS, LOCAL
2. STOMATITIS, APHTHOUS.

KIK
KG 114/00
Pri
P

**PERBEDAAN WAKTU SEMBUH OBAT OLES ANTI SEPTIK
KOMBINASI DEKUALINIUM KLORIDA 0,5 % DAN
TIMOL 0,25 % DENGAN OBAT OLES
POVIDONE IODINE 10 % TERHADAP
RECURRENT APHTHOUS
STOMATITIS MINOR**

SKRIPSI



Oleh :


ROSA PRIMINTA
029612316

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERBEDAAN WAKTU SEMBUH OBAT OLES ANTI SEPTIK
KOMBINASI DEKUALINIUM KLORIDA 0,5 % DAN
TIMOL 0,25 % DENGAN OBAT OLES
POVIDONE IODINE 10 % TERHADAP
RECURRENT APHTHOUS
STOMATITIS MINOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga



Oleh :

ROSA PRIMINTA
NIM. 029612316

Mengetahui / menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adiastuti'.

Adiastuti Endah P. drg., Mkes
NIP. 131 406 101

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Priyo Hadi'.

Priyo Hadi, drg., MS
NIP. 130 873 450

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

☞ Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa obat oles kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% mempunyai efektifitas yang sama dengan obat oles Povidone iodine 10% terutama terhadap waktu sembuh lesi RAS minor, sehingga obat oles kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif.

☞ Saran - saran

Dengan adanya penelitian efektifitas obat oles kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% terhadap kesembuhan lesi RAS minor maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan efektifitas penggunaan obat oles kombinasi Dekualinium klorida 0,5% dan Timol 0,25% terhadap kesembuhan lesi RAS major, herpetiform ulser, traumatic ulser dan lesi – lesi ulserasi yang lain.